

Avertissements agricoles

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Regisseur de Recettes de la D.R.A.F.
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

Bulletin destiné aux agriculteurs du Lauragais, du Razès et de la Piège
rédigé en collaboration avec MM. Mailhol, Vène (Ferme de Loudes) Boy,
Moulet (CAL) Barrière (CIVAM) Bonhotte, Boyer, Escande, Sicard (GVA)
Bernard, Faure (SPV)

N° 8 C du 17 MAI 1989

GRANDES CULTURES N° 7


L'extension géographique de la **ROUILLE JAUNE** est difficile à maîtriser en
raison du stade végétatif des blés. Il est absolument indispensable que
chacun vérifie l'état sanitaire de ces propres cultures

CARTE FOYERS ROUILLE JAUNE




SYMPTOMES

ROUILLE JAUNE



ROUILLE BRUNE



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tel. 67 92 41 42

Imprimerie de la Station d'Avertissements Agricoles - Le Directeur, M. FREYDIER - N° d'inscription 531 AD
© Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.



76

ROUILLE JAUNE

Là où elle est présente son agressivité est extrêmement importante; l'effet des produits n'est pas immédiat et il vaut mieux dans ce cas précis intervenir préventivement; nous vous rappelons que l'aboutissement d'une attaque de Rouille Jaune est l'anéantissement total de la récolte.

OBSERVEZ TOUTES VOS PARCELLES plusieurs cas peuvent se présenter :

1° sur attaque déclarée : **ONDENE** 1 L/HA
 HORIZON 1 L/HA

2° sur parcelles indemnes de rouille non encore traitées ou dont le dernier traitement remonte à 15 jours :

TILT C 1 L/HA
 ALTO AMBEL 0,5 L/HA
 PUNCH C 0,8 L/HA
 IMPACT TX 2,5 L/HA
 VIGIL 1 L/HA
 HORIZON 1 L/HA

3° parcelles à traiter Rouille et Pucerons évitez la spécialité Horizon qui ne doit pas être mélangée à un insecticide (risque de colmatage de l'appareil) ou seulement avec Pirimor G à l'exclusion de tout autre

NOTE CONCERNANT LA SPECIALITE HORIZON

Des cas de phytotoxicité ont été signalés, il s'agit de problèmes particuliers et surtout observés sur blés durs et plus particulièrement sur Ardente. Ces accidents ne sont pas seulement imputables au Tébuconazole qui est la matière active de l'Horizon car ils ont également été observés avec d'autres Triazoles; ce phénomène est toutefois très limité et ne doit pas vous conduire à écarter cette spécialité de votre panoplie de produits de traitement

AUTRES MALADIES : évolution très lente de la ROUILLE BRUNE
régression de l'OIDIUM

PUCERONS DES EPIS de nombreuses parcelles sont colonisées plus particulièrement dans le Razès; il convient de traiter à partir de l'épiaison si

1 épi sur 2 est occupé par au moins 1 puceron
incorporez au fongicide une des spécialités suivantes :
(avec Horizon seulement Pirimor G)

FASTAC	0,3	L/HA	DECIS	0,25	L/HA
TALSTAR	0,05	L/HA	SERK	1,5	L/HA
BAYTHROID	0,3	L/HA	KARATE	0,125	L/HA
KAFIL	0,25	L/HA	PIRIMOR G	0,25	KG/HA

TOURNESOL

Le réseau de surveillance fonctionne. Aucun risque pour le moment
AUCUN TRAITEMENT N'EST A EFFECTUER

MAIS


Le piégeage de la sésamie est en place vous serez tenu au courant de l'évolution de ce ravageur



BLÉ : MALADIES DU FEUILLAGE


Septorioses

Septoria tritici




Points noirs (pycnides) visibles à l'oeil nu

Septoria nodorum



Taches losangiques à marge jaunâtre (chlorotique)


Septoria nodorum



Pycnides visibles à la loupe

Rouilles

Rouille jaune




Pustules alignées en stries parallèles aux nervures

Rouille brune



Début d'attaque ; pustules arrondies, dispersées


Rouille brune




Pustule vue à la loupe

Oïdium


Sur feuilles... mais aussi sur tige



Début d'attaque



Attaque ancienne



Attaque sur tige